

Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten (2015)

Inhalt

1	Alkoholkonsum.....	3
1.1	Erwachsene Bevölkerung.....	3
1.2	Jugendliche.....	4
1.3	Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen.....	5
1.4	Alkoholunfälle im Straßenverkehr.....	6
1.5	Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner	6
1.6	Rangfolge ausgewählter Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf.....	7
1.7	Alkoholsteuern.....	7
2	Tabakkonsum	8
2.1	Daten zum Konsum.....	8
2.2	Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher.....	9
2.3	Anteil jugendlicher Raucher/innen.....	9
3	Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential.....	10
3.1	Medikamentenmissbrauch und- abhängigkeit	10
3.2	Tägliche Einnahme von Medikamenten	11
4	Konsum illegaler Drogen	12
4.1	12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen bei Jugendlichen und Erwachsenen	12
4.2	Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen	12
4.3	Cannabis, Kokain und Amphetamine: Missbrauch und Abhängigkeit	13
4.4	Erstkonsumenten harter Drogen	13
4.5	Rauschgiftdelikte	14
4.6	Drogentote in Deutschland.....	14
4.7	Sicherstellungen illegaler Drogen in Europa.....	14
4.8	Prävalenzraten zum Drogenkonsum im internationalen Vergleich	15

5	Pathologisches Glücksspiel	16
5.1	Anzahl pathologischer Glücksspieler in Beratung und Behandlung.....	16
5.2	Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern	16
5.3	Umsatzanteile der Glücksspielanbieter	16
6	Pathologischer PC- / Internetgebrauch	17
6.1	Internetabhängigkeit: problematischer Konsum und Abhängigkeit.....	17
6.2	Prävalenz der Internetabhängigkeit nach Altersgruppen	17
7	Leistungen der Suchtrehabilitation 2014 – Deutsche Rentenversicherung (DRV)	18
7.1	Anträge und Bewilligungen DRV : Entwöhnungsbehandlung	18
7.2	Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV	18
7.3	Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahre nach stationärer Alkohol-Entwöhnung.....	19
7.4	Wirksamkeit der Suchtbehandlung 1 Jahr nach Behandlungsende – FVS-Studien.....	19
7.4.1	Effektivität der stationären Suchtrehabilitation – hier: Fachkliniken für Alkohol/Medikamente	20
7.4.2	Effektivität der stationären Drogenrehabilitation	20
7.4.3	Effektivität der ambulanten Suchtrehabilitation	20
7.4.4	Effektivität der ganztägig ambulanten / teilstationären Suchtrehabilitation	21
8	Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe	21
9	Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen	22
10	Suchtkranke in Deutschland: Schätzungen	22
	Literaturquellen	23

1 Alkoholkonsum

1.1 Erwachsene Bevölkerung (18-64 Jahre)¹⁾

Risikoarmer, riskanter gefährlicher und Hochkonsum bei Erwachsenen				
	Männer	entspricht etwa	Frauen	entspricht etwa
Risikoarmer Konsum	0-24g	0-0,6ℓ Bier 0,25ℓ Wein	0-12g	0-0,3ℓ Bier 0,14ℓ Wein
Riskanter Konsum	24-60g	0,6-1,6ℓ Bier 0,25-0,7ℓ Wein	12-40g	0,3-1,0ℓ Bier 0,14-0,5ℓ Wein
Gefährlicher Konsum	60-120g	1,6-3,1ℓ Bier 0,7-1,4ℓ Wein	40-80g	1,0-2,1ℓ Bier 0,5-0,9ℓ Wein
Hochkonsum	>120g	>3,1ℓ Bier >1,4ℓ Wein	>80g	>2,1ℓ Bier >0,9ℓ Wein

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) [in%]				
	2012 (18-64J.)			2006 (18-59 J.)
	Gesamt	M	F	Gesamt
Abstinent (mind. 30 Tage)	28,5	23,0	34,1	23,3
Risikoarmer Konsum	57,3	61,4	53,1	61,8
Riskanter Konsum	12,0	12,6	11,5	10,6
Gefährlicher Konsum	1,8	2,4	1,2	3,7
Hochkonsum	0,4	0,7	0,1	0,6

Prävalenz des Rauschtrinkens (5 oder mehr Gläser Alkohol) bei Erwachsenen (18 – 64 Jahre) in den letzten 30 Tagen [in %] 2012			
Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	64,5	53,2	78,1
1-3 mal	21,3	26,1	15,4
4 mal und mehr	14,3	20,6	6,6

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 21-24-Jährige (20,6 %), gefolgt von den 18-20-Jährigen (18,7 %) statt.

Alkoholabhängigkeit/-missbrauch 2012 (DSM IV)			
	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	3,4 % (1,77 Mio.)	4,8%	2,0%
Anteil Alkoholmissbrauch	3,1 % (1,61 Mio.)	4,7%	1,5%

1.2 Jugendliche (12-25 Jahre)³⁾⁴⁾




Abbildung 1.2.1: Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an mind. 1 Tag im letzten Monat bei Jugendlichen (ab 2012 wurde bei weiblichen Jugendlichen der Referenzwert von 4 oder mehr Gläsern verwendet).

30-Tage-Prävalenz des Rauschtrinkens bei Jugendlichen [%]															
	2008			2010			2011			2012			2014		
	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀
12-15	8,0	7,9	8,1	6,6	8,3	4,9	5,6	6,7	4,5	6,3	6,1	6,5	5,4	5,3	5,5
16-17	41,4	48,5	33,9	35,4	43,1	27,3	33,9	45,0	22,2	39,7	43,9	35,2	32,4	33,3	31,5
18-21	44,1	54,6	33,1	39,9	51,5	27,6	43,6	55,7	30,9	45,8	52,6	38,8	40,1	45,9	34,1
22-25	37,5	51,4	23,2	35,9	47,3	24,1	40,2	53,4	26,6	42,4	53,1	31,1	37,9	42,4	33,2




Abbildung 1.2.2: Anzahl der Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen.

Häufiges Rauschtrinken (mind. 4x/Monat) bei Jugendlichen [in%]							
	Gesamt	Jungen			Mädchen		
	2014	2004	2011	2014	2004	2011	2014
12-15 Jahre	1,4	3,9	1,4	1,5	1,7	1,3	1,4
16-17 Jahre	8,1	19,8	12,4	10,0	8,5	3,7	6,0

1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen⁴⁾¹¹⁾

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten) 2007, davon:		ca. 26,7 Mrd. €
- direkte Kosten (Behandlung, Sachschäden / Verkehrsunfälle, Rettungsdienst etc.)		10,0 Mrd. €
- indirekte Kosten (Ressourcenverluste, z.B. Verlust an Arbeitsleistung, Frühberentung, Arbeits-, Erwerbsunfähigkeit)		16,7 Mrd. €
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000
Rehabilitationsmaßnahmen		ca. 40.000
Krankenhausfälle (F 10 Diagnosen) 2013		338.204
Stationäre Behandlung aufgrund von Alkoholintoxikation (10-20-Jährige) 2013		23.267
Frühberentungen		5.000

Straftaten unter Alkoholeinfluss⁴⁾: 2013	Alle Straftaten	davon: mit Alkoholeinfluss	% aller Straftaten
Gewaltkriminalität gesamt	172.071	53.071	30,8
davon (Auswahl):			
- Gefährliche und schwere Körperverletzung	138.170	46.307	33,5
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung	6.277	1.653	26,3
- Totschlag und Tötung auf Verlangen	1.837	666	36,3
- Mord	784	132	16,8
Sachbeschädigung	139.786	37.118	26,6
Alle Tatverdächtigen	2.094.160	264.201	12,6

1.4 Alkoholunfälle im Straßenverkehr⁴⁾




Abbildung 1.4.1: Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol bzw. 0,15 mg/l Atemalkoholkonzentration)

1.5 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 2001 - 2013⁴⁾⁵⁾ in Litern

	Erhebungsjahr									
	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Bierkonsum	106,6	107,3	107,2	107,4	109,6	111,1	111,8	116,1	115,3	115,9
Weinkonsum	21,1	20,8	20,2	20,5	20,1	20,7	20,6	20,1	19,9	20,1
Schaumweinkonsum	4,0	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Spirituosenkonsum	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8
Pro-Kopf-Verbrauch Alkohol in Litern	137,2	137,8	136,9	137,2	139,0	141,2	141,6	145,6	144,6	145,5
Pro-Kopf-Verbrauch reiner Alkohol	9,7	9,7	9,6	9,6	9,7	9,9	9,9	10,1	10,0	10,1
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3.221 Mio. €	3.284 Mio. €	3.323 Mio. €	3.149 Mio. €	3.305 Mio. €	3.325 Mio. €	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	543 Mio. €	562 Mio. €	585 Mio. €	525 Mio. €	471 Mio. €	552 Mio. €	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €

1.6 Rangfolge ausgewählter Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2009 im Alter von 15 Jahren und mehr ⁴⁾

	Registrierter Konsum	Nichtregistrierter Konsum
1. Tschechien	15,11	1,50
2. Rumänien	13,30	3,00
3. Slowenien	12,31	3,00
4. Slowakei	11,59	3,00
5. Ungarn	11,65	2,50
6. Estland	13,35	0,70
7. Polen	10,60	3,00
8. Portugal	11,43	2,00
9. Spanien	11,67	1,40
10. Litauen	12,62	0,40
13. Deutschland	11,87	1,00
EU	10,85	1,60

1.7 Alkoholsteuern in Mio. € ⁴⁾




Abbildung 1.7.1: Alkoholsteuern in Mio. €: 2006-2013.

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Biersteuer	669	697	702	713	730	739	757	778	777	787	786
Schaumweinsteuer	434	450	454	422	446	430	371	421	424	436	432
Branntweinsteuer	2.118	2.138	2.167	2.014	2.129	2.156	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232
Gesamt	3.221	3.284	3.323	3.149	3.305	3.325	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450

2 Tabakkonsum

2.1 Daten zum Konsum ⁴⁾

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Zigaretten (in Stück)	79,5 Mrd. (-0,9%)	80,3 Mrd. (-2,6%)	82,4 Mrd. (-5,9%)	87,6 Mrd. (+4,8%)	83,6 Mrd. (-3,5%)	86,6 Mrd. (-1,6%)	87,9 Mrd. (-3,8%)	91,5 Mrd. (-2,1%)	93,4 Mrd. (-2,5%)
Feinschnitt (in Tonnen)	25.700 (-0,1%)	25.734 (-4,4%)	26.922 (-0,4%)	27.043 (+6,1%)	25.486 (+4,4%)	24.403 (+11,7%)	21.849 (-2,4%)	22.381 (-1,4%)	22.762 (-31,7%)
Pfeifentabak (in Tonnen)	1.359 (+13,2%)	1.200 (+16,6%)	1.029 (+12,4%)	915 (+21,0%)	756 (-6,3%)	806 (-57,2%)	1.883 (+17,0%)	1.608 (+74,5%)	922 (+14,7%)

Einnahmen Tabaksteuern 2006 - 2014 (Mio. €) (Netto)									
	Erhebungsjahr								
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Zigaretten	12.334	12.195	12.281	12.702	11.876	12.141	12.261	12.862	12.974
Zigarillos / Zigarren	129	121	129	106	65	62	86	111	83
Feinschnitt	1.840	1.769	1.778	1.639	1.391	1.329	1.167	1.232	1.291
Pfeifentabak	39	35	30	27	23	24	50	43	26
Gesamt	14.342	14.119	14.218	14.473	13.355	13.556	13.563	14.248	14.375

Ausgaben für Tabak 2006 - 2014 (Mio. €)									
	Erhebungsjahr								
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Zigaretten	20.462	20.147	20.106	20.643	19.200	19.625	19.425	19.992	19.913
Zigarillos/Zigarren	773	714	747	736	656	625	720	823	783
Feinschnitt	3.516	3.350	3.304	3.033	2.583	2.436	2.170	2.162	2.339
Pfeifentabak	131	121	105	97	84	88	145	132	95
Gesamt	24.882	24.332	24.261	24.509	22.522	22.775	22.460	23.110	23.130

Ausgaben der Tabakindustrie für Werbung, Promotion und Sponsoring ⁴⁾		
	2012 in €^{*)}	<i>*) Tabakwerberichtlinie der EU: Anfang 2007 Werbeverbot für Tabakerzeugnisse in Hörfunk und Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Internet. Auch Sponsoring von Veranstaltungen mit grenzüberschreitender Wirkung (z.B. Formel-1-Rennen) ist untersagt. Weiterhin möglich ist z.B. Kino-, Plakatwerbung, Sponsoring regionaler Veranstaltungen</i>
Gesamt	220.761.000	
Davon: - Werbung in Printmedien	235.000	
- Außenwerbung	75.986.000	
- Werbung im Kino	3.950.000	
- Werbung im Internet	4.000	
- Sonstige Werbung	50.000	
- Promotion	135.397.000	
- Sponsorship	5.139.000	

2.2 Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre ¹⁾

Anteil der Raucher (18-64 J, 2012)			
	Gesamt	Männer	Frauen
Raucher	30,2 %	34,0 %	26,2 %




Abbildung 2.2.1: Konsumfrequenz der Raucher (18-64 Jahre) im letzten Monat.

Prävalenz Nikotinabhängigkeit nach DSM IV (%) (2012) (18 – 64 J.)										
	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
DSM IV Abhängigkeit	10,8 (5,58 Mio.)	12,5	9,0	7,7	13,2	13,8	12,5	11,2	9,1	7,4

2.3 Anteil jugendlicher Raucher/innen (12 - 17 Jahre) 2012 in % ²⁾

Jahr	1997	2007	2008	2011	2012	2014
Gesamt	28,1	17,7	15,4	11,7	12,0	9,7
weiblich	28,9	17,5	16,2	12,4	12,6	8,9
männlich	27,4	17,8	14,7	11,1	11,5	10,5

3 Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential

3.1 Medikamentenmissbrauch und- abhängigkeit 2012 (18-64 Jahre)¹⁾

Medikamentenmissbrauch und-abhängigkeit in der deutschen Bevölkerung (18-64 Jahre) 2012			
	Gesamt	Männer	Frauen
Missbrauch	4,61 Mio.	2,30 Mio.	2,30 Mio.
Abhängigkeit	2,31 Mio.	1,04 Mio.	1,27 Mio.

Medikamentenmissbrauch und- abhängigkeit 2012 in % nach Geschlecht (18-64 Jahre)				
		Gesamt	Männer	Frauen
Schmerzmittel	Missbrauch	8,7	8,5	8,8
	Abhängigkeit	3,4	3,0	3,7
Schlafmittel	Missbrauch	0,8	0,8	0,8
	Abhängigkeit	0,8	0,8	0,9
Beruhigungsmittel	Missbrauch	0,8	0,8	0,8
	Abhängigkeit	1,4	1,4	1,3

Medikamentenmissbrauch und- abhängigkeit 2012 in % nach Altersgruppen									
		Gesamt	18-20 J.	21-24 J.	25-29 J.	30-39 J.	40-49 J.	50-59 J.	60-64 J.
Schmerzmittel	Missbrauch	8,7	6,9	9,4	10,5	11,8	9,1	6,7	5,2
	Abhängigkeit	3,4	2,1	1,9	1,9	3,0	4,5	4,0	2,6
Schlafmittel	Missbrauch	0,8	0,4	0,4	1,1	0,5	0,8	1,2	0,5
	Abhängigkeit	0,8	0,5	0,8	0,7	1,0	1,0	0,9	0,2
Beruhigungsmittel	Missbrauch	0,8	0,2	0,7	1,6	0,6	0,7	0,9	0,6
	Abhängigkeit	1,4	0,5	0,6	0,5	1,2	1,8	2,0	0,8

3.2 Tägliche Einnahme von Medikamenten nach Altersgruppen¹⁾




Abbildung 3.2.1: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Einnahme von Medikamenten nach Altersgruppen (2012).

30-Tage-Prävalenz der wöchentlichen bzw. täglichen Einnahme von Medikamenten [in %]								
	Mind. wöchentliche Einnahme					Tägliche Einnahme		
	Ges	M	F	18-20J.	50-59J.	Ges	18-20J.	50-59J.
Schmerzmittel	18,5	16,3	20,7	12,6	21,0	4,2	2,0	6,3
Schlafmittel	2,4	1,8	3,1	1,3	3,8	0,8	0,7	1,1
Beruhigungsmittel	2,7	2,4	2,9	1,2	4,5	1,2	0,4	2,2
Anregungsmittel	0,5	0,7	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4
Appetitzügler	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1
Antidepressiva	4,8	4,3	5,4	1,2	7,9	4,2	1,1	7,2
Neuroleptika	1,1	1,0	1,1	0,8	1,9	1,0	0,8	1,8
Anabolika	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2

4 Konsum illegaler Drogen

4.1 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen bei Jugendlichen von 12-17 Jahren (Drogenaffinitätsstudie 2011) und Erwachsenen von 18-64 Jahren (Epidemiologischer Suchtsurvey 2012) nach Geschlecht in %^{1/6)}

	Drogenaffinitätsstudie 2011			Epidemiologischer Suchtsurvey 2012		
	(12 bis 17 Jahre)			(18 bis 64 Jahre)		
	Gesamt	Männlich	Weiblich	Gesamt	Männlich	Weiblich
Irgendeine illegale Droge	4,9	6,6	3,1	-	-	-
Cannabis	4,6	6,2	2,8	4,5	6,4	3,0
Anderer Drogen als Cannabis	1,0	1,6	0,4	0,5	-	-
Amphetamine	0,4	0,5	0,3	0,7	1,2	0,3
Ecstasy	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,1
LSD	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,1
Heroin	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
Anderer Opiate	-	-	-	0,3	0,4	0,3
Kokain	0,2	0,1	0,3	0,8	1,3	0,3
Crack	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Schnüffelstoffe	0,1	0,3	0,0	-	-	-
Pilze	-	-	-	0,3	0,5	0,1
Spice	-	-	-	0,2	0,3	0,0

4.2 Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen⁶⁾¹³⁾

Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen [in%]		
	12-17 Jahre	18-25 Jahre
Lebenszeit	7,2	38,3
12 Monate	4,9	14,3
30 Tage	2,0	5,8
Regelmäßiger Konsum	0,9	3,7

30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums bei Jugendlichen [in %]								
Jahr	1997		2008		2011		2012	
Alter	12 – 25 J.	12 – 17 J.	12 – 25 J.	12 – 17 J.	12 – 25 J.	12 – 17 J.	12 – 25 J.	12 – 17 J.
Gesamt	7,7	4,8	3,7	2,6	4,0	1,9	4,7	2,0
weiblich	6,0	6,4	2,6	2,1	2,9	1,2	6,4	2,5
männlich	9,4	3,3	4,8	3,1	5,2	2,5	2,8	1,5

12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen bei Jugendlichen [in%]		
	12-17 Jahre	18-25 Jahre
Irgendeine Droge	4,9	14,3
Cannabis	4,6	13,5
Illegale Droge außer Cannabis	1,0	4,3
Amphetamin	0,4	1,6
Ecstasy	0,2	1,0
Heroin	0,0	0,0
Kokain	0,2	0,9

4.3 Cannabis, Kokain und Amphetamine: Missbrauch und Abhängigkeit nach DSM-IV (letzte 12 Monate) (%) (2012)¹⁾ 18 – 64 Jahre

		Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
					18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Cannabis	Missbr.	0,5	0,8	0,2	1,5	2,3	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0
	Abh.	0,5	0,8	0,2	1,3	1,4	2,3	0,3	0,1	0,2	0,0
Kokain	Missbr.	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abh.	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0
Amphetamine	Missbr.	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0
	Abh.	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0


4.4 Erstkonsumenten harter Drogen 2010-2013⁴⁾

	2010	2011	2012	2013
Heroin	3.201	2.742	2.090	1.789
Kokain	3.211	3.343	3.263	3.173
Amphetamin	12.043	14.402	13.728	10.975
davon: Crystal Meth	642	693	556	746
Ecstasy	840	942	1.257	1.480

4.5 Rauschgiftdelikte 2009 - 2013 ⁴⁾⁵⁾

	2009	2010	2011	2012	2013
Rauschgiftdelikte (Verstöße gegen BTMG)	235.842	231.007	236.478	237.150	253.525
davon:					
konsumnahe Delikte (z.B. Besitz, Erwerb, Abgabe)	169.689	165.880	170.297	173.337	189.783
Handelsdelikte (z.B. Handel, Schmuggel etc.)	50.965	49.622	50.791	47.667	46.834

4.6 Drogentote in Deutschland ⁴⁾



1998	1.674
1999	1.812
2000	2.030
2001	1.835
2002	1.513
2003	1.477
2004	1.385
2005	1.326
2006	1.296
2007	1.394
2008	1.449
2009	1.331
2010	1.237
2011	986
2012	944
2013	1002

Abbildung 4.6.1: Anzahl der Drogentoten von 1998 bis 2013.

4.7 Sicherstellungen illegaler Drogen in Europa 2013 ¹²⁾




Abb. 4.7.1: Sicherstellungen illegaler Drogen in Europa

4.8 Prävalenzraten zum Drogenkonsum im internationalen Vergleich 2013 ¹²⁾

	Lebenszeit	Letztes Jahr		Behandlungsaufnahme
	15-64 Jahre	15-64 Jahre	15-34 Jahre	
1. Cannabis				
Europa	23,3% (78,9 Mio.)	5,3% (18,1 Mio.)	11,7%	29,4 %
Deutschland	23,1%		11,1%	36,3%
Frankreich	40,9%		22,1%	44,1%
Niederlande	25,7%		13,7%	47,8%
Portugal	9,4%		5,1%	26,8%
Spanien	30,4%		17,0%	29,9%
2. Kokain				
Europa	4,6% (15,6 Mio.)	1,0% (3,4 Mio.)	1,7%	13,5%
Deutschland	3,4%		1,6%	
3. Amphetamine				
Europa	3,5% (12,0 Mio.)	0,5% (1,6 Mio.)	1,0%	6,7%
Deutschland	3,1%		1,8%	
4. Ecstasy				
Europa	3,6% (12,3 Mio.)	0,6% (2,1 Mio.)	1,4%	0,3%
Deutschland	2,7%		0,9%	
5. Opioid				
Europa	1,3 Mio. problematische Opiatkonsumenten Hauptdroge bei ca. 41% aller Drogentherapienachfragen 700.000 erhielten 2013 eine Substitutionstherapie			

5 Pathologisches Glücksspiel

5.1 Anzahl pathologischer Glücksspieler in Beratung und Behandlung 2012⁴⁾

Problematische und pathologische Glücksspieler	Anzahl
Problematisches Spielverhalten	362.000 (0,68%)
Pathologisches Spielverhalten	436.000 (0,82%)
Davon:	
- in ambulanten Beratungsstellen	ca. 18.800
- Anteil (Anzahl) in stationären Rehaeinrichtungen	5,1% Einzel- bzw. 3,0% Hauptdiagnosen (1.988 Einzel- / 1.159 Hauptdiagnosen)

5.2 Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft (ohne Geldspielautomaten) (Mrd. €)⁴⁾

Erhebungsjahr										
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4,39	4,37	4,25	4,13	3,90	3,37	3,21	2,99	3,02	2,86	3,23

5.3 Umsatzanteile der Glücksspielanbieter 2013⁴⁾




Abbildung 5.1.1: Glücksspielanbieter 2012 in Anteilen am Gesamtumsatz (33,11 Mrd.)

6 Pathologischer PC- / Internetgebrauch

6.1 Internetabhängigkeit: problematischer Konsum und Abhängigkeit in Deutschland bei 14-64-Jährigen (PINTA-Studie 2011)⁸⁾

	Problematischer Konsum	Abhängigkeit
Gesamt	4,6%	1,0-1,5%
Frauen	4,4%	0,8-1,3%
Männer	4,9%	1,2-1,7%

6.2 Prävalenz der Internetabhängigkeit nach Altersgruppen (PINTA-Studie 2011)⁸⁾

Alter	Gesamt	Frauen	Männer
14-64	1,0%	0,8%	1,2%
14-24	2,4%	2,4%	2,5%
14-16	4,0%	4,9%	3,1%

7 Leistungen der Suchtrehabilitation 2014 – Deutsche Rentenversicherung (DRV)


7.1 Anträge und Bewilligungen DRV (2014): Entwöhnungsbehandlung⁹⁾

Anträge 2014	95.653
Bewilligungen 2014	71.742

7.2 Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV (2014)⁹⁾

Abgeschlossene Leistungen 2014	50.485
a) davon: ambulant	7.014
ganztäglich ambulant	2.406
stationär	41.065
b) davon: Männer	38.081
- Alkohol	25.774
- Drogen	11.966
- Mehrfachabhängige	19
- Medikamente	322
Frauen	12.404
- Alkohol	9.649
- Drogen	2.507
- Mehrfachabhängige	2
- Medikamente	246

7.3 Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahre nach stationärer Alkohol-Entwöhnung 2010 (DRV)



Bereich Reha-Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik

7.4 Wirksamkeit der Suchtbehandlung 1 Jahr nach Behandlungsende – FVS-Studien Entlassjahrgang 2012¹⁰⁾

Gemessen wird der Behandlungserfolg 1 Jahr nach Behandlungsende. Die Erfolgsquote wird nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie berechnet. Nachfolgend werden folgende Berechnungsformen verwendet:

DGSS 1: Hier werden alle Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung zugrunde gelegt.

DGSS 4: Hier wird der gesamte Entlassjahrgang zugrunde gelegt, Nichtantworter und widersprüchliche Informationen werden generell als rückfällig eingestuft.

Während die Berechnungsform DGSS 1 eine Überschätzung des Behandlungserfolgs bedeutet (nur Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung gehen ein), resultiert aus DGSS 4 eine Unterschätzung des Behandlungserfolgs (alle Nichtantworter bzw. widersprüchliche Informationen werden als rückfällig gewertet). Der „wahre“ Wert wird somit zwischen diesen beiden Ergebnissen liegen.

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Behandlungsformen (stationär, ambulant, ganztägig ambulant/teilstationär) sind nicht direkt vergleichbar, da sich die Klientel hinsichtlich der Patientenmerkmale voneinander unterscheidet.

7.4.1 Effektivität der stationären Suchtrehabilitation – hier: Fachkliniken für Alkohol/Medikamente (Bachmeier, R. et al., SuchtAktuell 01.15)

Gesamter Entlassjahrgang	13.976 Patienten
Katamneseantworter (Anteil)	7.335 Patienten (55,5 %)
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	77,4 %
DGSS 4	41,7 %

7.4.2 Effektivität der stationären Drogenrehabilitation (Fischer, M., Kemmann, D. et al., SuchtAktuell 01.15)

Gesamter Entlassjahrgang	1.275 Patienten
Katamneseantworter (Anteil)	409 Patienten (32,1 %)
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	70,3 %
DGSS 4	21,2 %

7.4.3 Effektivität der ambulanten Suchtrehabilitation (Lange, N., Neeb, K. et al., SuchtAktuell 01.15)

Gesamter Entlassjahrgang	435 Patienten
Katamneseantworter (Anteil)	273 Patienten (62,7 %)
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	85,6 %
DGSS 4	51,9 %

* Für das Kriterium „abstinent nach Rückfall“ wurde die Zeitdauer von zuletzt mindestens 30 Tage Abstinenz nach dem erfolgten Rückfall verwendet.

7.4.4 Effektivität der ganztägig ambulanten / teilstationären Suchtrehabilitation (Schneider, B., Mielke, D. et al., SuchtAktuell 01.15)

Gesamter Entlassjahrgang	334 Patienten
Katamneseantworter (Anteil)	167 Patienten (50,0 %)
Katamnestic Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“*	
DGSS 1	85,3 %
DGSS 4	40,7 %

8 Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe⁵⁾ (J. Leune, 2014)

Art der Einrichtung	Anzahl	Plätze
Beratungsstellen und -dienste (pro Jahr) ca.	> 1.300	>500.000
Substitutionsbehandlung mit psychosozialer Betreuung (registriert)		75.400
Niedrigschwellige Angebote	> 300	
Entzug mit Motivationsanteilen	190	> 2.000
Spezialisierte Krankenhausabteilungen	> 300	> 7.500
Vollstationäre Rehabilitation	320	13.200
Ganztägig ambulanten Rehabilitation	100	> 1.000
Adaptionseinrichtungen	115	> 1.200
Ambulantes Betreutes Wohnen	460	> 12.000
Stationäre Einrichtungen der Sozialtherapie	268	>10.700
Teilstationäre Einrichtungen der Sozialtherapie	112	> 1.200
Arbeitsprojekte/Qualifizierungsmaßnahmen	250	> 4.800
Selbsthilfegruppen	8.700	

* Für das Kriterium „abstinent nach Rückfall“ wurde die Zeitdauer von zuletzt mindestens 30 Tage Abstinenz nach dem erfolgten Rückfall verwendet.

9 Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen nach Altersgruppen, 2012⁷⁾

Alter	F10 Alkohol	F11 Opiode	F12 Cannabinoide	F13 Sedativa/ Hypnotika	F14 Kokain	F16 Halluzinogene	F18 Lösungsmittel	F19 Multiple Substanzen	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)
unter 15	3.317	8	292	50	2	7	14	137	
15-25	37.018	1.994	6.534	692	282	250	52	9.534	
25-35	40.910	10.186	3.570	1.557	770	174	36	17.395	
35-45	66.174	9.378	910	1.673	464	60	14	10.239	
45-55	108.996	4.462	337	2.145	168	17	9	4.991	
55-65	59.012	1.110	59	1.596	15	10	3	1.134	
über 65	22.777	824	6	1.994	1	8	7	396	
Summe	338.204	27.962	11.708	9.707	1.702	472	135	43.826	Σ 439.818

10 Suchtkranke in Deutschland: Schätzungen zu Abhängigkeitserkrankungen

Substanz	Anzahl	Quelle
Alkohol	1.770.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Tabak	5.580.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Medikamente	2.300.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Illegale Drogen – hier: Cannabis / Kokain / Amphetamin	319.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Pathologisches Glücksspiel	436.000	BZgA (2014): Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland 2013. Köln.

Literaturquellen

- 1) Pabst, A., Kraus, L., Gomes de Matos, E. & Piontek, D.: Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012, Sucht, 59. Jahrgang, Heft 6, Dezember 2013
- 2) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Tabakkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014, Mai 2015, Köln
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014, Juni 2015, Köln
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 15, ISBN 978-3-95853-043-0, Lengerich 2015
- 5) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 14, ISBN 978-3-89967-916-8, Lengerich 2014
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2011, Februar 2012, Köln
- 7) Statistisches Bundesamt: Gesundheit - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern (einschl. Sterbe- und Stundenfälle), Fachserie 12 Reihe 6.2.1, Wiesbaden 2015
- 8) Bundesministerium für Gesundheit: Prävalenz der Internetabhängigkeit – Diagnostik und Risikoprofile (PINTA-DIARI), August 2013
- 9) Statistik der Deutschen Rentenversicherung: Rehabilitation 2013
- 10) Fachverband Sucht e.V.: **SuchtAktuell**, Jahrgang 22, 01.15
- 11) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 12, ISBN 978-3-87581-310-4, Lengerich 2012
- 12) Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht: Europäischer Drogenbericht 2015. ISBN: 978-92-9168-799-2
- 13) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2012, Juni 2014, Köln.